

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛІВОЛАКТ
(LIVOLACTUM)**

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 капсула препарату містить лецитину (фосфоліпідів не менше 97%) 0,2 г;
допоміжні речовини: лактози моногидрат, лактози моногидрат, кремнію діоксид колоїдний, магнію стеарат, тальк.

Лікарська форма. Капсули.

Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул – порошок жовтого або жовтого з світло-коричневим відтінком, з характерним специфічним запахом. Можлива незначна грудкуватість.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ "НВП "Аріадна".
Україна, 65085, м. Одеса, вул. Моторна, 8 А.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.
Код АТС А05В А50**.

Фосфоліпіди (естери ненасичених жирних кислот, гліцерину і фосфохоліну) є життєво важливими компонентами всіх клітинних мембран. Мембрани клітин печінки містять до 65 % фосфоліпідів. Гідрофільні і гідрофобні частини молекул фосфоліпідів утворюють двошарову структуру, які формують мембрани. У результаті низької несприятливих впливів молекули фосфоліпідів, що входять до складу мембран, ушкоджуються, внаслідок чого порушуються функції мембран. Фосфоліпіди, що входять до складу Ліволакт, ліквіднують дефекти в мембрані, відновлюючи її функціональну активність. Це має значення у відновленні не тільки мембран клітин печінки, але й головного мозку, міокарда, шкіри та інших органів. Фосфоліпіди є важливим компонентом ліпопротеїнових комплексів плазми крові. Особливо важлива їх наявність у ліпопротеїнах високої щільності, що перешкоджають відкладенню холестерину у стінках судин і розвитку атеросклерозу та його ускладнень. Антиоксидантні властивості фосфоліпідів пов'язані з наявністю в їхньому складі залишків поліненасичених жирних кислот, які інактивують вільні радикали, що утворюються в процесі перекисного окиснення ліпідів.

Показання для застосування.

Гострий і хронічний гепатит різної етіології, жировий дистрофічний гепатит, цироз печінки, порушення функцій печінки при інших захворюваннях; токсикози вагітних; псоріаз; радіаційний синдром.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.

Особливі застереження.

У складі препарату міститься лактоза. Тому препарат слід призначати з обережністю пацієнтам, які страждають на непереносимість лактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю без будь-яких обмежень.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат можна застосовувати дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Дітям старше 12 років і дорослим – по 3 капсули 3 рази на день.
Приймають внутрішньо за 30 хв до їди. У разі потреби капсулу можна розкрити і змішати з невеликою кількістю теплої води (не вище 37 °С) до утворення суспензії.
Мінімальна тривалість курсу терапії – 2 - 3 місяці.

Передозування.

Не описано.

Побічні ефекти.

При застосуванні препарату побічних ефектів та алергічних реакцій не виявлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не описано.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.