ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЕЦИТИН
(LECITHIN)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 капсула містить 1200 мг сойового лецитину.
допоміжні речовини: вода очищена, желатин, гліцерин.

Лікарська форма. Капсули.

Продовгуваті, напівпрозорі, м'які желатинові капсули янтарного кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.
«ФАРМЕТІКС ІНК», Канада.
3695, Ауторуут де Лауреншиз, Лавал, Квк, Канада, H7L 3H7.
3695, Autoroute des Laurentides, Laval, Qc, Canada H7L 3H7 .

Фармакотерапевтична група. Препарати що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні засоби. Код АТС A05B A50.

Фосфоліпіди є основною частиною всіх клітинних мембран та органел, вони відіграють значну роль у клітинному метаболізмі, процесах детоксикації і регенерації клітини. Препарат має виражені мембраностабілізуючі, гепатопротекторні властивості, відновлює і захищає клітинну структуру печінки. Лецитин є складовою частиною міелінових оболонок нервових клітин і волокон, сприяючи передачі нервово-м'язового імпульсу. Сприяє поновленню сурфактантної системи легенів, збільшує кількість поверхнево-активних речовин і нормалізує біохімічний стан конденсату повітря, яке видихається. Має виражені кардіопротекторні властивості. Знижує рівень холестерину в крові, покращує співвідношення показників ліпідограми, знижує коефіцієнт атерогенності. Лецитин призначають для профілактики та лікування синдрому гострої та хронічної дихальної недостатності за допомогою корекції порушень фосфоліпідного складу легеневого сурфактанту. Має виражені гепатопротекторні і кардіопротекторні властивості.

Показання для застосування.
У склад і комплексної терапії таких захворювань і станів:
- жирова дистрофія печінки різного походження;
- гострий гепатит у стадії реабілітації, хронічний гепатит;
- гестози вагітних;
- токсичні ураження печінки, що пов'язані з діабетом та/або алкоголізмом;
- ішемічний інсульт, покращення постінсультного стану з метою підвищення рухових і психічних функцій;
- атеросклероз, гіперхолестеринемія (дисліпідемія);
- дихальна недостатність, пневмонія, гострий обструктивний бронхіт у стадії реабілітації, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, туберкульоз легенів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Особливі застереження.
Не перевищувати рекомендовану дозу. Лецитин слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із жовчо-кам'яною хворобою, при загостренні панкреатиту. При тривалому застосуванні Лецитину слід вживати їжу, яка містить значну кількість вітаміну С та кальцію, або застосовувати препарати вітаміну С та кальцію з метою нейтралізації шкідливих продуктів метаболізму лецитину.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат у ці періоди застосовують за призначенням лікаря, не перевищуючи рекомендовані дози. Лецитин як ліпотропний засіб призначають при гестозах вагітних.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Даних немає.
Діти. Застосовують дітям віком від 7 років.

Спосіб застосування та дози.
Застосовують внутрішньо дорослим і дітям віком від 7 років.
Дорослим – по 1 капсулі 2 рази на день до їди. Дітям віком від 7 років – по 1 капсулі на день до їди. Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання.

Передозування.
Не відоме.

Побічні ефекти. Застосування препарату може спричинити виникнення алергічних реакцій у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів Лецитину. Можливі розлади з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, діарея (при тривалому застосуванні).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.
Зберігати при кімнатній температурі у сухому, недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 100 або по 30 капсул у пластикових флаконах.

Категорія відпуску.
Без рецепта.